## Désignation du Lectotype de *Rhyacia elegans anatolica* DRAUDT, 1936 = *Chersotis anatolica* (DRAUDT) bona sp.

## Zoltan VARGA

Zoologisches Institut, Universität L. Kossuth, H-4010 Debrecen, Hongrie.

Afin de fixer l'espèce reconnue distincte de *Chersotis elegans* par C. Dufay (*Nota Lepid.*, note précédente), il convient de désigner un Lectotype de *Rhyacia elegans anatolica* Draudt, 1936, parmi les quelques syntypes de ce taxon qui existent encore dans la collection du Niederösterreichisches Landesmuseum à Vienne.

Je désigne donc ici le Lectotype et les autres spécimens comme paralectotypes :

Rhyacia elegans anatolica subsp. n., DRAUDT, 1936 (Ent. Rundsch. 53 (33): 469) = Chersotis anatolica (DRAUDT, 1936), bona sp.

Lectotype: 1 &, étiqueté ainsi: Anatolia / Akschehir / Sultan Dagh / 1700-2200 m / 1-15.IX.1934 / coll. PFEIFFER; armure génitale préparation ZOLTAN VARGA n° 2616.

Paralectotypes : 2  $\eth$ , étiquetés de la même façon ; armures génitales, préparations Z. V. n° 2611 et 2615.

Ces trois exemplaires in Coll. Niederösterreichisches Landesmuseum, Vienne, Autriche (ex coll. L. Schwingenschuss).